

DLP - 6 - 6 - 85521909

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

Bulletin n° 6 du 22/05/1985

AVERTISSEMENT DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes)
(les GVA, les CIVAM et les Coopératives)

- CEREALES : La Rouille Brune est toujours présente mais n'a pas progressé cette semaine, toutefois, les conditions de son développement sont réunies et on peut s'attendre à une nouvelle explosion, les parcelles tardives seront plus particulièrement concernées. Les seuils indiqués sur nos précédents bulletins, restent valables, observez vos cultures et traitez si la rouille est présente sur un des trois derniers étages foliaires. Les parcelles épiées ayant reçu une première application voilà 15 jours ou 3 semaines, devront être à nouveau protégées.

- CULTURES EPIEES : Utilisez une des solutions suivantes :
  . IMPACT T .... 2,7 litres/Ha
  . BAYFIDAN D .... 4 litres + 0,5 l/Ha
  . TILT SP .... 2 litres/Ha

- AVANT EPIAISON : . IMPACT R .... 1,3 litre/Ha
  . CORVET CM .... 4 Kgs/Ha
  . TILT C .... 1 litre/Ha
  . BAYFIDAN D .... 4 litres + 0,5 l/Ha (emballage associatif)

.../....

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

P5

- <u>POIS PROTEAGINEUX</u> :

  . Le Mildiou est toujours présent,

  . Anthracnose et Botrytis sont stationnaires.
  Pour les parcelles à Anthracnose et Botrytis dominants, utilisez PELTAR à 4 Kgs/Ha.
  Parcelles à risque Mildiou dominant, préférez DITHANE M 45 à 2,5 Kgs/Ha.

  <u>En cas de doute, consultez votre technicien.</u>

  . <u>Pucerons</u> : Ils sont présents dans toutes les parcelles observées, il est nécessaire de les détruire, Utilisez PIRIMOR G à 0,5 Kgs/Ha.
  Vous pouvez mélanger cette spécialité aux fongicides précités.

- TOURNESOL
- MAIS
- SOJA

Dégâts possibles de limaces, en cas de nécessité, procédez à l'épandage d'une spécialité Molluscicide.

(Tirage du 22 mai 1985 - 1600 exemplaires).